

富露施®
FLUIMUCIL®

乙酰半胱氨酸颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

OTC

【药品名称】

通用名称：乙酰半胱氨酸颗粒

商品名称：富露施

英文名称：Acetylcysteine Granules

汉语拼音：Yixian Banguang'ansuan Keli

【成份】本品每包含乙酰半胱氨酸0.1克。辅料为：橙汁颗粒、橙味香精、日落黄(E-110)、蔗糖、糖精钠。

【性状】本品为橙色可溶性细颗粒；气芳香，味甜。

【作用类别】本品为祛痰药类非处方药药品。

【适应症】适用于慢性支气管炎等咳嗽有粘痰而不易咳出的患者。

【规格】0.1克

【用法用量】

口服。临用前加少量温水溶解，混匀服用，或直接口服。

成人：一次2包，一日3次；

2岁以上儿童：一次1包，一日2-4次。

【不良反应】

- 对呼吸道黏膜有刺激作用，故有时引起呛咳或支气管痉挛。
- 水溶液中有硫化氢的臭味，部分病人可引起恶心、呕吐、流涕、胃炎等。
- 偶可引起咯血。

【禁忌】

1. 哮喘患者禁用。

2. 2岁以下儿童禁用。

【注意事项】

- 老年患者伴有严重呼吸功能不全者慎用。
- 消化道溃疡患者应在医师指导下使用。
- 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 本品性状发生改变时禁止使用。
- 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 儿童必须在成人监护下使用。
- 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 2~6岁儿童请在医师指导下使用。
- 本品为一种粘液溶解剂，仅对咳痰症状有一定作用，在使用时应注意咳嗽、咳痰的原因，如使用7日后未见好转，应及时就医。

【药物相互作用】

- 本品能增加金制剂的排泄。
- 应避免本品与抗生素在同一个溶液内混合服用。
- 本品不得与糜蛋白酶配伍用药。
- 本品不可与酸性药物同用，否则可降低本品作用。
- 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】由于其化学结构中的巯基可使粘蛋白的双硫键断裂，降低痰粘度，使痰容易咳出。

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【包装】纸铝复合膜包装；(1)6包/盒；(2)8包/盒；(3)10包/盒；(4)12包/盒；(5)14包/盒；(6)20包/盒；(7)28包/盒；(8)30包/盒；(9)32包/盒；(10)40包/盒。

【有效期】36个月

【执行标准】YBH11982021

【批准文号】国药准字H20000472

【说明书修订日期】2021年09月02日

【药品上市许可持有人】

名称：海南赞邦制药有限公司
注册地址：海南省海口市科园路20号
邮政编码：570314
联系方式：0898-68631288
传真：0898-68636924
网址：www.zambon.com.cn

【生产企业】

企业名称：海南赞邦制药有限公司
生产地址：海南省海口市科园路20号
邮政编码：570314
联系方式：0898-68631288
传真：0898-68636924
网址：www.zambon.com.cn

如有问题可与生产企业联系。

